

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC HIGHLIGHTER YELLOW

Мешавина за употребу у тетовирању.

Састав: вода, глицерин, ЦИ 77891, ЦИ 19140, вода хамамелиса, утиленгликол.

Без едностручног упутства за употребу: Пожељно за једног корисника. Припремите површину за пигментацију у одговарајућим асептичним условима. Ставите тачну количину производа у појединачни стерилни контејнер за једнократну употребу (шољу). По завршетку радова, контејнер и преостали садржај иће елиминисани, по важећим прописима о одлагању отпада.

Са стерилном иглом за једнократну употребу, имплантирајте производ. Ослободите апликатора мора да користи хируршке рукавице.

Мере предострожности: Тест алергије на кожу ће увек бити обављен унапред за сваки од производа који ће се користити, од стране квалификованог стручњака. Садржи никел и/или хром (ВИ). Може изазвати алергичке реакције.

Упозорења: Никада немојте у ацивати иглу у посуду.

Никада немојте користити производ који је остао из контејнера, нити за ретуширање клијента. Користите стерилне игле и контејнере за једнократну употребу.

Немојте удисати или гутати садржај.

Не руковати у контејнеру. Ако приметите да је контејнер неовлашћен, аците га. Чувајте контејнер на одговарајућем месту за складиштење да истесачували стабилност. Након извршене микропигментације, не треба вршити никакве манипулације на имплантираном подручју.

Након извршене пигментације не треба користити шминку, нити користити контактна сочива, све до најмање 8 дана након истека пигментације.

Након извршене микропигментације, не треба вршити никакве манипулације на имплантираном подручју.

Не препоручује се сунчање (вештачко или природно) до 3 месеца након имплантације. Препоруке: Пре почетка лечења треба узети у обзир следећа запажања: · Ово су особине са посебном пажњом дијагностичари, са имунолошком слаaboшћу, са тегома у лечењу, труднице, хемофилици и друге патологије.

· Примена производа се не препоручује особама оболелим од гљивица, локалне инфекције коже, локалног дерматитиса, модрица, опекотина од сунца, невуса, келоида, нестализованих ожиљака на кожи, екцема, псоријазе, локалне упале, алергичких реакција.

· Стање физичког и психичког здравља клијента мора бити адекватно пре спровођења имплантације.

· У случају тровања или случајног гутања, позовите Токсиколошке информативне медицинске службе ваше земље.

Погледајте у MSDS контакт за производ у вашој земљи/региону.

Трајање имплантације: Пигментација ће варирати у зависности од величине коју треба направити, никада не прелази 4 сата од имплантације.

Уклањање имплантата: Уколико се одлучи да се имплантација уклони, то мора да уради лекар специјалиста.

Посебни услови складиштења за производ: Чувајте на хладном и сувом месту. Не остављајте изложене сунцу.